

# CARCOMAS

## ESPECIES MÁS COMUNES



### *Anobium punctatum*

**Nombre Común**  
Carcoma común

#### Larva

Tamaño de 6 mm, aproximadamente.  
Son de color blanco amarillento.  
Tienen el cuerpo en forma de C, donde el final del abdomen es ensanchado.  
Presentan pequeñas espinas a lo largo de todo el cuerpo

#### Adulto

Cuerpo pequeño (3-7mm). Ojos muy grandes y separados. El pronoto tiene forma de capucha y oculta prácticamente la cabeza. Los élitros presentan filas de pequeños agujeros bien definidos.

#### Daños

Dejan agujeros circulares en la madera de 1 a 2 mm de diámetro. Las larvas hacen túneles del mismo diámetro, produciendo polvillo o serrín.

#### Hábitat

En muebles, puertas, tarimas, madera decorativa, pinturas. Se puede encontrar en maderas duras también, como haya, cerezo, abeto o abedul, incluso en maderas infectadas por hongos.

#### Ciclo de vida

La duración del ciclo biológico de esta especie varía de los 8 meses hasta varios años. La hembra puede colocar de 20 a 40 huevos, cuando se mantiene en torno a los 20 °C.



### *Lyctus brunneus*

**Nombre Común**  
Carcoma del parquet

#### Larva

Tamaño de 6 mm, aproximadamente.  
Color casi blanco. Cuerpo en forma de C, con el tórax agrandado. Antena y patas cortas. Presenta un par de pequeñas espinas en la parte trasera.

#### Adulto

Cuerpo alargado y estrecho, color marrón rojizo oscuro. Mide 3-5mm. Cabeza siempre visible desde arriba. Antenas con una maza de dos segmentos.

#### Daños

Forman agujeros de salida de 1-2 mm. Las larvas hacen galerías interconectadas entre sí.

#### Hábitat

Ataca a madera puesta en obra y muebles, con humedades entre el 6-30%. Prefiere maderas duras de frondosas como roble, nogal o fresno.

#### Ciclo de vida

La duración del ciclo biológico puede durar entre 8 y 12 meses. Se pueden dar dos ciclos anuales, con la salida de los adultos en primavera y en otoño.



### *Hylotrupes bajulus*

**Nombre Común**  
Carcoma gigante

#### Larva

Tamaño de 31 mm de largo, aproximadamente. Son de color blanco. Tienen el cuerpo de forma alargada, con el tórax más ancho y con patas cortas. Presentan 3 ocelos.

#### Adulto

El escarabajo es color negro amarronado, cubierto de vellos grisáceos. Cuerpo alargado, aplanado y ovalado. Sen los élitros encontramos bandas transversales. Presenta antenas muy largas y finas. Mide 8-25mm.

#### Daños

Forma agujeros sobre la madera de 6 a 10 mm de diámetro. Producen acumulaciones de polvillo o frass alrededor del tubo de salida. Generan un sonido característico que indica su presencia como barrenador de la madera.

#### Hábitat

La carcoma gigante solo ataca madera blanda y relativamente seca, principalmente de pino. Se puede detectar en las estructuras de madera de las casas, como postes, tablas o vigas.

#### Ciclo de vida

La duración del ciclo biológico de esta especie varía de los 5 años en climas cálidos hasta los 8-12 años en países fríos.